



Promip
TeleMip®

Embalagem	Quantidade
Tubetes	Ovos à granel

COMPOSIÇÃO

TeleMip® é um agente biológico formulado a partir de insetos vivos de *Telenomus podisi*, que deve ser utilizado para o controle biológico do Percevejo-marrom da soja, *Euschistus heros*, em todas as culturas com ocorrência da praga alvo.

TeleMip® é comercializado na forma de ovos parasitados pela microvespa *Telenomus podisi*. Os ovos parasitados são acondicionados em embalagens específicas para o transporte, garantindo a viabilidade dos parasitoides e consequentemente sua eficiência no controle do alvo biológico em campo.

AÇÃO

Após a emergência, as fêmeas adultas iniciam o forrageamento, buscando os ovos do Percevejo-marrom. Ao encontrarem, as fêmeas depositam seis ovos no interior dos ovos da praga, impedindo seu desenvolvimento, logo no início do ciclo.



ARMAZENAMENTO

TeleMip® pode ser aplicado antes ou após a emergência dos primeiros insetos (a depender da modalidade de aplicação). **TeleMip®** poderá ser armazenado antes da emergência dos insetos, respeitando a data de validade do produto.

Temperatura mínima	Temperatura máxima
20°C	25°C

VANTAGEM

Após o parasitismo os ovos do percevejo tornam-se escuros dando origem à novas microvespas que reiniciarão o ciclo, atacando novos ovos da praga alvo, reduzindo sua população e, conseqüentemente, os danos ocasionados à cultura.

TeleMip® não oferece riscos de desenvolvimento de resistência e promove o controle da praga em situações onde os inseticidas químicos já perderam sua eficácia.

TeleMip® não deixa resíduos na cultura, preserva os inimigos naturais, polinizadores e outros agentes benéficos, contribuindo para o equilíbrio ecológico e melhores resultados para o agricultor.

MODO DE USO

TeleMip® pode ser aplicado utilizando drones (a granel) ou manualmente (em cápsulas). Em áreas maiores do que 100 hectares, recomenda-se que a aplicação de **TeleMip®** seja realizada com o uso de drones, método que permite uma rápida e eficiente distribuição das microvespas em grandes áreas. Para mais informações consulte a bula.



 Promip
TeleMip[®]

Ao receber o produto o agricultor deverá ajustar a dose entre 5 e 10mL/ha. A dose mais alta deve ser utilizada nas áreas com maior pressão do alvo biológico ou quando a lavoura tiver como objetivo a produção de sementes. A menor dose deve ser utilizada nas áreas de menor pressão da praga ou nas áreas destinadas à produção de grãos. Recomenda-se realizar três liberações em intervalos de sete dias.

CULTURAS RECOMENDADA

TeleMip[®] é especialmente recomendado para o parasitismo e controle do Percevejo-marrom em soja.



ATENÇÃO

TeleMip[®] pode ser utilizado de forma integrada a outros métodos de controle como químicos e biológicos. Para isso, consulte nossa assistência técnica para saber mais sobre compatibilidade. A Promip tem um corpo técnico altamente capacitado que poderá orientar o produtor em relação a melhor forma de uso do **TeleMip**[®]

Registro MAPA nº 20321.